VAKSIN TERBARU DI INDONESIA

Piprim Basarah Yanuarso

Pendiri Rumah Vaksinasi Indonesia

Epidemiologi

**Ada lebih dari
60.000 kasus
Japanese
encephalitis per
tahun**

CDC
Centers for Disease Control
and Prevention

Penyebaran penyakit melalui Nyamuk

Adapted from ref 3: Misra U & Kalita. J. (2010)

Di wilayah Asia Tenggara musim hujan hampir terjadi sepanjang tahun → penyebaran virus JE tjd sepanjang tahun

Sekitar 9 dari 10 kasus JE terjadi pada anak2 usia < 15 th

- Mayoritas kasus JE tidak memiliki gejala/tidak spesifik
- Anak-anak & usia lanjut → umum menderita kesakitan scr klinis → BERAT
- Masa inkubasi sekitar 5-15 hari
- Gejala dapat berkembang mjd BERAT → ensefalitis, kejang, koma, kelumpuhan

JAPANESE ENCEPHALITIS SYMPTOMS

Ada lebih dari 60.000 kasus Japanese Encephalitis per tahun

15.000

Meninggal (25%), terutama anak-anak

25.000

Orang (50% dr yg selamat) menderita kelainan neurologis yg menetap

25.500

Orang selamat tanpa kelainan berat

60,000

1–20 dari 1,000 individu yang terinfeksi menjadi ensefalitis (1)

Dari semua yang terdiagnosa infeksi JE

20–30%

• Meninggal Dunia

70–80%

• Sembuh

Dari korban yang sembuh

50%

• Sembuh dengan kelainan

- 30% dengan kelainan motorik [1]
- 20% dengan kejang [1]
- 20% dengan keterbatasan kognitif dan gangguan bicara [1]

50%

• Tanpa kelainan / kelainan ringan (2)

- Gangguan Belajar
- Gangguan Perilaku
- Gejala sisa lainnya

1. Digana (2007), 2. Solomon (2000)

Rekomendasi WHO (2015)

- Vaksinasi JE wajib dicantumkan di dalam rekomendasi nasional di area dimana JE dianggap sebagai masalah kesehatan, walaupun jumlah kasusnya sedikit.
- Rekomendasi ini akan menjadikan penularan JE pada manusia dapat diputuskan walaupun sirkulasi virus pada hewan terus berlangsung.
- Strategi imunisasi untuk JE di daerah endemik adalah penyuluhan pada target populasi primer (<15 tahun), diikuti dengan dimasukkannya vaksin JE di dalam program rutin imunisasi anak
- Di daerah endemik, rekomendasi WHO adalah 1 dosis vaksinasi JE.
- Pemberian vaksin lain secara bersamaan (ko-administrasi) dapat diterima karena alasan program, bahkan untuk vaksinasi masal

Siapa saja yang beresiko terinfeksi Japanese encephalitis?

**ORANG YG
TINGGAL DI AREA
ENDEMIS**

TRAVELLER

- Yang akan berpergian ke area endemis
- Yg akan tinggal lebih dari sebulan di area yg beresiko
- Dg waktu perjalanan singkat & beresiko

Jadwal Pemberian Vaksin JE

Indikasi untuk individu usia > 12 bulan

1 dosis

Booster

96% anak usia 12-24 bulan mendapatkan seroproteksi 28 hari setelah vaksinasi primer satu dosis

Booster 1 kali untuk di bawah 18 tahun pada anak yang telah divaksinasi JE sebelumnya memberikan proteksi 100% setelah 28 hari dan peningkatan antibodi secara signifikan (57 kali)

Memori respon imun tampak nyata 7 hari setelah pemberian booster

KIPI

Sekitar 1% - 1,2%
Berlangsung < 3 hari

Vaksin JE memiliki profil keamanan yang baik

Kesimpulan

- **Vaksin JE diindikasikan untuk individu usia 12 bulan ke atas**
- **Dosis tunggal untuk dewasa, booster 12-24 bulan setelah vaksinasi primer akan memberikan proteksi jangka panjang untuk anak-anak.**
- **Vaksin JE memiliki profil keamanan yang baik**

Dengue Vaccine

DENGUE ADALAH PENYAKIT VIRUS MENULAR

- Disebabkan oleh virus dengue
- merupakan penyakit endemik yg ditularkan oleh nyamuk dan dapat menjadi berbahaya dan mematikan
- Secara umum disebut demam “sendi”¹
- Bentuk berat dari penyakit ini disebut²:
 - Demam berdarah dengue
 - Sindrom syok dengue

*Aedes aegypti*¹

*Aedes albopictus*²

Foto 9252 berkat CDC/Frank Hadley

- Kaki berlurik putih dan tanda putih melengkung pada cangkang
- Spesies invasif domestik
- Vektor primer

Foto 1864 berkat CDC/James Gathany

- Kaki berlurik putih dan tanda putih linear pada cangkang
- Disebut Nyamuk macan asia
- Vektor sekunder

1. CDC. 2015. *Aedes aegypti* mosquito.
2. CDC. 2015. *Aedes albopictus* mosquito.

SIAPA PUN DAPAT TERINFEKSI OLEH VIRUS DENGUE

Infeksi virus dengue dapat mengenai siapa pun tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau kelas sosial ekonomi¹

PENYAKIT INFEKSI DENGUE ADALAH MASALAH KESEHATAN UMUM YANG BERKEMBANG

Sekitar 50% populasi di dunia berisiko terinfeksi virus dengue¹

1. WHO. 2014. Dengue and severe dengue. Fact sheet No.117.

INFEKSI VIRUS DENGUE ADALAH MASALAH KESEHATAN UMUM UTAMA DAN INSIDENNYA MENINGKAT

2012

■ WILAYAH DENGAN RISIKO DENGUE

- Insiden meningkat 30 kali lipat selama lebih dari 50 tahun terakhir.
- Lebih dari 100 negara endemik.
- Penyebaran dengue sejalan dengan meluasnya sebaran vektor nyamuk.
- WHO memberikan peringkat dengue sebagai penyakit virus yang ditularkan oleh vektor dengan penyebaran tercepat.

WHO, 2012, Global Strategy for Dengue Prevention and Control.
WHO, 2009, Dengue Guidelines for Diagnosis, Treatment, Prevention, and Control.
Gubler, 1998, Clin Microbiol Rev.
Halstead, 1992, World Health Stat Q.
Simmons, 2012, New Engl J Med.

WILAYAH GLOBAL BERISIKO DENGUE

Wilayah tropis dan subtropis berisiko dengue¹

AREA-AREA DI ASIA TENGGARA BERISIKO DENGUE - 2012

Jumlah dan keparahan kasus dengue meningkat di Asia

DENGUE IN ASIA

THE NUMBER STORY

ASIA

IS THE MOST IMPACTED
REGION WITH ABOUT

75%

OF THE GLOBAL BURDEN OF

DENGUE

HOTSPOTS IN ASIA

PHILIPPINES 166,107 CASES

THAILAND 150,454 CASES

INDONESIA 101,218 CASES

VIETNAM 66,140 CASES

MALAYSIA 43,346 CASES

SINGAPORE 22,205 CASES

Pada tahun 2016, lebih dari 155.000 orang di Indonesia terinfeksi dengue

Penularan Dengue

Ada empat serotipe dengue, jadi walaupun pasien telah terkena dengue, Masih ada kemungkinan untuk terkena berulang kali setelah infeksi pertama

SIGNS & SYMPTOMS OF DENGUE FEVER

todayhealthtips.com

High Fever

Headache

Joint & Muscle Pain

Rashes

Vomiting

Severe Diarrhea

Hepatomegaly

Circulatory Problems

Namun, sebagian besar infeksi dengue tidak menimbulkan gejala

DENGUE DAPAT MEMBURUK DAN MENGANCAM JIWA

- **Kebocoran plasma** → penumpukan cairan pd jaringan sekitar paru dan rongga perut
- **Perdarahan hebat** → pada hidung & gusi bahkan organ dalam
- **Kerusakan organ** → pembesaran hati dan masalah pada jaringan otak

Demam Berdarah Dengue
Dengue Syok Syndrom

Di Indonesia, lebih dari 1.200 orang meninggal akibat DBD hingga Oktober 2016

PERKIRAAN INSIDEN DENGUE

Piramida Terbalik Insiden Dengue^{1,2}

WHO, 2012, Global Strategy for Dengue Prevention and Control.
Bhatt, 2013, Nature.

BESARAN PENYAKIT TIDAK DITETAPKAN DENGAN BAIK DAN SULIT DIPERKIRAKAN

Perkiraan WHO

50-100 juta
Infeksi
per tahun

Perkiraan Berdasarkan *Modeling 2013*

96 juta
infeksi simtomatik
per tahun

294 juta
infeksi asimtomatik
per tahun

Berkontribusi terhadap besarnya
infeksi
yang mempengaruhi
beban penyakit

WHO= Organisasi Kesehatan Dunia.

WHO, 2012, Global Strategy for Dengue Prevention and Control.
Bhatt, 2013, Nature.

SETIAP MENIT,
SATU ORANG TERINFEKSI DENGUE DIRAWAT INAP

500.000 orang dengan dengue berat harus dirawat inap setiap tahun¹

DEMAM BERDARAH DENGUE,
SINDROM SYOK DENGUE

SETIAP MENIT 1 ORANG
TERINFEKSI DENGUE
DIRAWAT INAP ¹

500.000 ORANG/ TAHUN KEBANYAKAN ANAK-ANAK

¹ WHO, Dengue and severe dengue, Fact sheet N° 117, January 2012, Available at <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs117/en/index.html>, Accessed July 2012.

DAMPAK PENYAKIT INFEKSI VIRUS DENGUE

- Penyakit infeksi virus dengue bisa sangat mempengaruhi individu, keluarga, atau masyarakat melalui hari-hari sakit di ranjang, tidak hadir kerja atau sekolah, kelelahan pasca infeksi, penurunan kualitas hidup, dan utang^{1,2}

1. Beatty. 2011. Am J Trop Hyg.
2. SP candidate dengue vaccine: target profile. 2015.

FAKTOR YANG MENINGKATKAN PENYEBARAN DENGUE

Kepadatan populasi di kawasan perkotaan

Kurangnya air dan sanitasi

Pemanasan global & perubahan iklim

Perjalanan global

Perdagangan & transportasi

1. WHO. 2011. Comprehensive guidelines for prevention and control of dengue.
2. CDC. 2015. Aedes aegypti mosquito.
3. WHO. 2014. Dengue and severe dengue. Fact sheet No. 117. DNG-TR-Disease-0616
4. WHO. 2009. Dengue guidelines.

PENCEGAHAN

Cegah Demam Berdarah Lakukan 3 M Plus

Seminggu sekali

1
Menguras tempat
penyimpanan air.

2
Menutup tempat
penampungan air.

3
Membuang dan
menutup barang
bekas yang dapat
menampung air.

Plus

- Hindari gigitan nyamuk terutama di pagi dan sore hari.
- Gunakan anti nyamuk oles dan pasang kelambu.

VAKSINASI

VAKSIN DENGUE

- VAKSIN DENGUE telah diteliti di 10 Negara paling endemik di Asia-Pasifik & Amerika Latin dengan >41.000 subyek mengikuti program pengembangan klinis.
- VAKSIN DENGUE memberikan perlindungan terhadap subyek yg sebelumnya pernah terpapar & yg belum pernah terkena dengue.
- VAKSIN DENGUE merupakan vaksin hidup, dilemahkan, tetravalent (serotipe1, 2, 3 dan 4)

JADWAL PEMBERIAN VAKSIN DENGUE

3 DOSIS

Usia 9 tahun – 16 tahun

Bulan ke 0

Bulan ke 6

Bulan ke 12

AMAN

EFEK SAMPING : **UMUM, RINGAN, SEMENTARA**

- Sakit kepala
- Nyeri otot
- Demam
- Rasa lemah
- Nyeri/ bengkak/ gatal

KESIMPULAN

Vaksin dengue :

- Membantu menurunkan resiko terkena dengue, dengue berat dan masuk rumah sakit karena dengue
- Mempunyai profil keamanan yang bisa diterima pada populasi yang diindikasikan
- Membantu melindungi dari empat tipe virus dengue

Don't Wait.
Vaccinate!

Terima kasih